

Số: 12/CV- KN

Thọ Xuân, ngày 28 tháng 02 năm 2019

V/v Hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Giám đốc các HTX nông nghiệp;
- Khuyến nông viên cơ sở.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại xã Định Long, huyện Yên Định. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, hiện nay chưa có vắc xin và thuốc đặc hiệu điều trị. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện...Trạm Khuyến nông hướng dẫn biện pháp phòng bệnh như sau:

1. Đặc điểm và triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra với tỷ lệ chết cao lên đến 100%; vi rút gây bệnh có sức đề kháng cao. Thời gian ủ bệnh từ 3 - 15 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh chỉ 3 - 4 ngày.

Triệu chứng thể cấp tính: Lợn sốt cao (40,5 - 42⁰C), lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chổng đống, lợn thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1 - 2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi có lẫn máu hoặc táo bón, phân cứng đóng viên có kích thước nhỏ, có chất nhầy máu. Lợn chết trong vòng 6 -13 hoặc 20 ngày.

2. Biện pháp phòng chống bệnh

Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc đặc hiệu điều trị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính.

- Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho vật nuôi như: Lở mồm long móng, dịch tả lợn, tụ huyết trùng, tai xanh...Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019 đạt kết quả cao.

- Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết, dịch bệnh. Cho vật nuôi ăn thức ăn giàu đạm như đậu tương, bã đậu, khô dầu lạc hoặc tôm, cua cá, thức ăn tổng hợp đậm đặc, tăng hàm lượng chất tinh (gạo, ngô, khoai, sắn). Bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa vào thức ăn. Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đảm bảo vệ sinh máng ăn, máng uống cho đàn lợn. Thường xuyên kiểm tra đàn lợn đặc biệt phát hiện sớm những bất thường như ỉu

oải, ủ rữ, kém ăn... để kịp thời cách ly, chẩn đoán và điều trị; phải báo cáo ngay với Cán bộ thú y xã, Trưởng thôn, chính quyền địa phương hoặc Trạm Thú y huyện để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống và điều trị.

- Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm, sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn, đảm bảo vệ sinh thú y; một số hóa chất sát trùng có hiệu quả cao, an toàn như Chlorofom, hợp chất iodine hoặc sử dụng Sodium hydroxide với tỷ lệ 8/1000 hoặc fomalin với tỷ lệ 3/1000.... phun thuốc sát trùng định kỳ 01 lần/tuần tại khu vực trong và xung quanh chuồng nuôi kết hợp rắc vôi bột. Phương tiện xe vận chuyển ra vào trang trại cần phải được phun xịt sát trùng trước khi vào.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Không giấu dịch, không bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh, không vứt xác gia súc, gia cầm ốm, chết ra ngoài môi trường xung quanh.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, chỉ đạo Đài truyền thanh xã tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về đặc điểm, triệu chứng và mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng để phòng chống bệnh hiệu quả.

Nơi nhận:

- Như trên (T/hiện);
- T.trục Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/cáo);
- Đài Truyền thanh huyện (đưa tin);
- Lưu KN.

**KT. TRƯỞNG TRẠM
PHÓ TRƯỞNG TRẠM**



Bùi Thị Nga